

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 回 覧 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

新型コロナウイルス3回目接種

Q. 接種券はいつ届きますか？

A. 次のスケジュールで発送しています。

| | | | | | |
|--------|----------------------|--------|--------|--------|--|
| 65歳以上 | 2回目接種日 令和3(2021)年 | ~11/13 | ~11/27 | ~12/18 | 以降、2回目 接種から5か 月経過を目途 に対象者に送 付予定です。 |
| | 発送予定日 令和4(2022)年 | 3/22 | 4/22 | 5/10 | |
| 18~64歳 | 2回目接種日 令和3(2021)年 | ~10/30 | ~11/20 | ~12/18 | |
| | 発送予定日 令和4(2022)年 | 3/22 | 4/22 | 5/10 | |
| 12~17歳 | 2回目接種日 令和3(2021)年 | ~10/30 | ~11/20 | ~12/18 | |
| | 発送予定日 令和4(2022)年 | 4/11 | 4/22 | 5/10 | |

接種券が届かない場合や紛失した場合は
再発行手続きを行ってください。

再発行手続きやワクチン接種の予約方法等
については、姫路市ホームページを
ご確認ください。



Q. どうして今接種が必要なのですか？

A. 感染拡大に備えて接種をおすすめします。

追加接種を希望される場合は、早期の3回目
接種をご検討ください。なお、国の方針により
現在4回目接種に向けて準備を進めております。



【入院治療等を要する者等推移】(厚生労働省ホームページより)

3
回目、
ご検討ください

【対象者】
2回目接種から
6か月以上経過した
12歳以上の方

◎3回目の接種の安全性と効果

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

| 発現割合 | ファイザー社 (2回目→3回目接種後の症状) | 武田/モデルナ社 (2回目→3回目接種後の症状) |
|----------|--|---|
| 50%以上 | 疼痛 (78.3→83.0%)、疲労 (59.4→63.7%) | 疼痛 (88.3→83.8%)、疲労 (65.4→58.7%) 頭痛 (58.8→55.1%) |
| 10 - 50% | 頭痛 (54.0→48.4%)、筋肉痛 (39.3→39.1%) 悪寒 (37.8→29.1%)、関節痛 (23.8→25.3%) | 筋肉痛 (58.1→49.1%)、関節痛 (42.9→41.3%) 悪寒 (44.3→35.3%)、リンパ節症 (14.2→20.4%) |
| 1 - 10% | 38度以上の発熱 (16.4→8.7%) 腫脹 (6.8→8.0%)、発赤 (5.6→5.9%) リンパ節症(※) (0.4→5.2%) | 38度以上の発熱 (15.5→6.6%) 腫脹・硬結 (12.3→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7→4.8%) |

(注) 対象/人数：ファイザー2回目 16～55歳/2,682人、ファイザー3回目 18～55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,691人、モデルナ3回目 18歳以上/167人

(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： 5ポイント以上少ないもの、 5ポイント以上多いもの。

(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典：特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン(※)を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50μg接種することになっているが、本研究では100μg接種した結果が報告されている。



出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

お問い合わせ



姫路市新型コロナワクチン接種予約受付コールセンター

☎ 050-5526-1090 (午前8時から午後7時まで、毎日)

姫路市保健所総務課 新型コロナワクチン担当

☎ 079-289-1800 (午前8時35分から午後5時20分まで、平日のみ)